

Biospia A La Prostata (1 de 2)

Este folleto contiene información importante respecto a la biopsia que se ha planeado. Por favor revise el material atentamente. Si tiene preguntas, llame a nuestro consultorio.

Cita:

Dia: _____ **Fecha:** _____ **Hora:** _____

Lugar:

- 201 East 19th Street, New York, NY 10003
- 3594 East Tremont Avenue, Suite 20, Bronx, NY 10465

Lo que necesita hacer antes de su biopsia:

Infómele a su médico sobre todos los medicamentos recetados y de venta libre que está usando. Algunos medicamentos tales como antiinflamatorios (usados para la artritis y el dolor) y los anticoagulantes aumentan el riesgo de hemorragia por la biopsia. Deje de tomar todos los medicamentos y suplementos anticoagulantes por lo menos 7 días antes de la biopsia. Se incluye entre los anticoagulantes más comunes a Plavix, Aggrenox, aspirina, Coumadin, medicamentos antiinflamatorios como Motrin, vitamina E y aceite de pescado. Abajo se proporciona una lista más completa. Por favor consulte con su médico de atención primaria o cardiólogo para ver si le permiten dejar de tomar estos medicamentos.

Advil	Cough/cold remedies	Flexeril	Naproxen
Aggrenox	Coumadin	Ibuprofen	Plavix
Aleve	Cyclobenzaprine	Indocin	Pletal
Anacin	Daypro	Indomethacin	Relafen
Anaprox	Diclofenoc	Ketorolac	Tramadol
Aspirin	Dipyridamole	Lovenox	Toradol
Azulfidine	Ecotrin	Meloxicam	Voltaren
Bufferin	Enbrel	Mobic	Warfarin
Celecoxib	Enoxaparin	Motrin	Xarelto
Cilostazol	Etodolac	Naprosyn	
Clopidogrel	Excedrin	Nabumetone	

Si usted está tomando Celebrex, puede seguir tomando este medicamento.

Un día antes de su biopsia, necesitará empezar a tomar sus antibióticos. Ya que la infección resultante por una biopsia es una complicación poco frecuente pero posible, usted recibirá dos recetas para dos antibióticos orales. La opción de antibióticos dependerá de qué medicamentos ha tomado antes y a cuáles es alérgico. Usualmente combinamos un antibiótico tipo quinolona (Avelox, ciprofloxacina, levofloxacina) con una penicilina (Augmentin - amoxicilina / ácido clavulánico). Si es alérgico o tiene sensibilidad a cualquiera de estos antibióticos, se le recetará otro medicamento. Por favor siga las instrucciones del frasco y revise el folleto del paquete para ver la lista de posibles efectos secundarios o precauciones.

Las indicaciones usuales se derailan aquí - Está bien tomar los dos antibióticos juntos:

Cipro (Ciprofloxacina) Una pastilla dos veces al día.

Levaquin (Levofloxacina) Una pastilla una vez en la mañana.

Augmentin (Amoxicilina - Clavulánico) Una pastilla dos veces al día.

Bactrim y Sulfa (Sulfametoxazol) - Trimetoprim). Una pastilla dos veces al día.

Biopsia A La Prostata (2 de 2)

Recuerde Tomar Los Antibióticos El Día La Biopsia

Los antibióticos se empiezan un día antes del procedimiento y se continúan por un total de 4 a 7 días. Debe tomar el medicamento por lo menos 1 hora antes de la tomar alimentos o 2 horas después de hacerlo. No tome antiácidos como Tums, Maalox, Mylanta ni suplementos de calcio dentro de 4 horas de haber tomado el antibiótico.

El la noche antes del procedimiento y también en la mañana del procedimiento necesitará hacerse un enema Fleet para vaciar y limpiar los intestinos. Coma una comida ligera antes de la biopsia. No necesita estar en ayunas.

Por favor venga al consultorio con 45 minutos o 1 hora antes de la biopsia porque necesitará recibir una inyección de antibiótico. no orine cuando venga a la oficina. Necesitaremos una muestra de orina después del procedimiento.

Nota: Si se le va a poner anestesia para la biopsia, no coma nada el día del procedimiento. No puede comer ni beber nada después de las doce de la noche antes de la biopsia.

Descripción del ultrasonido a la próstata biopsia

El ultrasonido usa ondas inofensivas de sonido para brindarnos imágenes de la próstata y permitir guiar exactamente la aguja de la biopsia a las áreas de preocupación. Por lo general el procedimiento se realiza en el consultorio. Se echará de costado en la mesa de exámenes. El urólogo le hará un examen rectal sencillo y luego se le insertará en el recto una sonda de ultrasonido del tamaño de un dedo. Usualmente se inyecta medicamento para adormecer el área alrededor de la próstata. Luego se inserta una aguja delgada para la biopsia a través de la sonda y dentro de la próstata. Por lo general se toman de 6 a 12 biopsias. Todo el examen dura menos de 10 minutos.

Después de la biopsia

- Continúe tomando sus antibióticos como se han indicado.
- No realice actividades extenuantes ni tenga relaciones sexuales por 3 días.
- Tome abundante líquidos para evitar coágulos de sangre en la orina.
- Puede ver sangre en la orina hasta por dos semanas y sangre en el semen hasta por un mes.
- Favor considere usar condones hasta que el semen esté claro.
- Puede sentir ardor al orinar por uno o dos días.
- Llame al médico o vaya a la sala de emergencia si tiene fiebre, escalofríos o no puede orinar.